Exercices de Physique - Terminale

Colin Coërchon

2023

1 Optique

1.1 Interférences

Exercice 1.1 : Phénomènes d'interférences lumineuses

Un **système interférentiel de Young** est constitué de fentes sources S_1 et S_2 , distantes de $a = 0,20$ mm éclairées par une source lumineuse S . À la distance $D = 1,50$ m des fentes, on dispose un écran perpendiculairement à l'axe de symétrie du système. La source lumineuse est un laser émettant une radiation de longueur d'onde $\lambda = 543$ nm.

1. Faire un schéma légendé du système interférentiel.
2. Établir la relation liant la différence de marche δ , a , D et x abscisse du point M sur l'écran.
3. Définir l'interfrange. Donner l'expression littérale de l'interfrange. La calculer.
4. Sachant qu'au point M, on observe une frange brillante, établir la relation entre x , a , λ , D et k .
5. Les franges brillantes s'étalent latéralement sur l'écran sur une largeur $d = 1,63$ cm, déterminer le nombre de franges brillantes observées sur l'écran.
6. On remplace la source précédente par un laser de longueur d'onde $\lambda' = 633$ nm. Calculer la valeur de la nouvelle interfrange i' . En déduire la largeur de la figure sur l'écran sachant que l'on observe 12 franges brillantes.

Démonstration.

1.

2. Premièrement, on peut écrire que la différence de marche δ entre la source primaire S et le point M peut s'écrire : $\delta = S_2M - S_1M$.

$$\text{Or, } \overrightarrow{S_1M} = \overrightarrow{S_1O} + \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M} = -\frac{a}{2} \vec{u}_x + D \vec{u}_y + x \vec{u}_x + z \vec{u}_z.$$

D'où :

$$S_1M = \sqrt{\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + D^2 + z^2} = D \sqrt{1 + \frac{\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + D^2 + z^2}{D^2}}$$

Or, $a \ll D$ et $|x|$ ou $|z| \ll D$. Donc, on peut écrire le développement limité "à la physicienne" :

$$D \sqrt{1 + \frac{\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + D^2 + z^2}{D^2}} \simeq D \left(1 + \frac{\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + z^2}{2D^2}\right)$$

$$\text{Et donc : } S_1M \simeq D \left(1 + \frac{\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + z^2}{2D^2}\right).$$

Et de la même manière, comme $\overrightarrow{S_2M} = \overrightarrow{S_2O} + \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M} = +\frac{a}{2} \vec{u}_x + D \vec{u}_y + x \vec{u}_x + z \vec{u}_z$:

$$\begin{aligned} S_2M &= \sqrt{\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + D^2 + z^2} = D \sqrt{1 + \frac{\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + D^2 + z^2}{D^2}} \\ \implies S_2M &\simeq D \left(1 + \frac{\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + z^2}{2D^2}\right) \end{aligned}$$

Ainsi, comme $\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 = x^2 + ax + \frac{a^2}{4} - \left(x^2 - ax + \frac{a^2}{4}\right) = 2ax$, on en déduit que :

$$\boxed{\delta = S_2M - S_1M \simeq \frac{ax}{D}}$$

NOTE : **La démonstration de ce résultat n'est pas à connaître** pour un élève de terminale, bien qu'elle n'en reste pas moins très intéressante. Le résultat est, quant à lui, à connaître **par cœur**.

3. Par définition, l'interfrange i est la distance séparant deux franges successives (2 franges brillantes, ou 2 franges sombres).

Supposons que nous avons une frange brillante en $x = x_k$.

Or, on rappelle que des interférences constructives apparaissent lorsque $\delta = k\lambda$, $k \in \mathbb{Z}$. Et ici, $\delta \simeq \frac{ax}{D}$.

Donc, en x_k , on a : $k\lambda = \frac{ax}{D} \implies x_k = \frac{k\lambda D}{a}$. Et, par conséquent, la prochaine frange brillante se situe en x_{k+1} où $x_{k+1} = \frac{(k+1)\lambda D}{a}$.

Ainsi, par définition :

$$i = |x_{k+1} - x_k| = \frac{\lambda D}{a}$$

A.N. On trouve : $i \simeq 4,1$ mm.

4. Nous venons de voir ce résultat dans la question (3). Ainsi, on a : $x_k = \frac{k\lambda D}{a}$
5. Les franges brillantes s'étalent latéralement sur l'écran sur une largeur d . Intéressons-nous à la partie supérieure de l'écran.

En s'aidant de la question précédente, l'objectif est alors de calculer le k maximum pour lequel les franges restent encore sur l'écran (pour des k plus élevés, les franges seront hors de l'écran). On s'intéresse à la partie supérieure de l'écran, donc de dimension $d/2$. Ainsi, on a :

$$\frac{d}{2} = x_{k_{max}} = \frac{k_{max}\lambda D}{a} \implies k_{max} = \left\lfloor \frac{ad}{2\lambda D} \right\rfloor$$

On obtient de même pour k_{min} et alors, en additionnant avec la frange centrale en $x = 0$ qui est toujours brillante, on a un total de franges brillantes qui vaut :

$$N_{brillantes} = k_{min} + 1 + k_{max} \implies N_{brillantes} = 1 + 2 \left\lfloor \frac{ad}{2\lambda D} \right\rfloor$$

A.N. On trouve que : $\frac{ad}{2\lambda D} \simeq 2,001$. Et donc : $N_{brillantes} = 5$.

NOTE : On pouvait aussi raisonner avec l'interfrange : $N_{brillantes} = 1 + \left\lfloor \frac{d}{i} \right\rfloor = 5 \dots$

6. On a $i' = |x'_{k+1} - x'_k| = \frac{\lambda' D}{a}$. A.N. $i' \simeq 4,7$ mm.

Or $N'_{brillantes} = 1 + \left\lfloor \frac{d'}{i'} \right\rfloor$. Donc, au maximum : $d' = (N'_{brillantes} - 1) i'$

A.N. On a $N'_{brillantes} = 12$ donc : $d' = 5,17$ cm.

□